

Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler/innen

Teilklausur Mathematik I (Analysis)

2. Klausur WS 99/00

1 8 PUNKTE

Gegeben sei die Funktion $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit

$$g(x) = -0.5x^2 + 15x - 62.5$$

- Ermitteln Sie die Nullstellen der Funktion g .
- Welche Steigung s hat die durch die Punkte $(9, g(9))$ und $(25, g(25))$ führende Sekante?
- Gemäß dem Mittelwertsatz der Differentialrechnung gibt es ein $x^* \in]9, 25[$ mit $g'(x^*) = s$. Bestimmen Sie x^* .

2 4 PUNKTE

Berechnen Sie folgendes Integral: $\int x^3 \cdot \ln(5x) dx$.

3 7 PUNKTE

Der Zerfall eines radioaktiven Elements läßt sich durch folgende Differentialgleichung beschreiben:

$$\frac{dN(t)}{dt} = -\alpha N(t)$$

$N(t)$: Teilchenzahl
 t : Zeit (in Jahren)
 α : Zerfallskonstante

- Berechnen Sie die Zerfallsfunktion $N(t)$ für das radioaktive Element. Zum Zeitpunkt $t = 0$ sei die Teilchenzahl $N(0) = N_0$. Die Zerfallskonstante habe den Wert $\alpha = 0.000462$.
- Berechnen Sie die Halbwertszeit τ des radioaktiven Elements, also die Zeit, nach der nurmehr die Hälfte des Anfangbestands an Teilchen vorhanden ist.

4 4 PUNKTE

Gegeben sei die Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 + 5x - 6}{x + 6} & \text{für } x < -6 \\ e^{x+6} - 8 & \text{für } x \geq -6 \end{cases}$$

Ist f an der Stelle $x = -6$ stetig? Begründung!

5 6 PUNKTE

Berechnen Sie mit der Regel von de l'Hospital

- $\lim_{x \rightarrow \infty} x^n \sin(1/x^n), \quad n \in \mathbb{N}$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2}$

6 5 PUNKTE

Zeigen Sie, daß für die kostenminimale Produktion eines Unternehmens folgende Bedingung gelten muß (Minimalkostenkombination):

$$\frac{q_1}{q_2} = \frac{\frac{\partial f(r_1, r_2)}{\partial r_1}}{\frac{\partial f(r_1, r_2)}{\partial r_2}}$$

Hierbei ist f die Produktionsfunktion, r_1 und r_2 sind die Einsatzmengen der Produktionsfaktoren, und q_1 und q_2 sind die Faktorpreise.

Bestimmen Sie zur Lösung mittels Lagrangeverfahren die stationären Stellen der Kostenfunktion $K(r_1, r_2) = q_1 \cdot r_1 + q_2 \cdot r_2$ unter Berücksichtigung der durch ein konstantes Produktionsniveau gegebenen Nebenbedingung: $f(r_1, r_2) = \bar{Q}$.

7 8 PUNKTE

Berechnen Sie $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x} dx$ und $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{(1+|x|)^2} dx$, sofern diese Integrale existieren.

8 6 PUNKTE

Gegeben sei die Abbildung

$$f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{mit} \quad f(x_1, x_2, x_3) = 4x_1^2 - x_2^2 + 5x_3^2.$$

Ferner gelten die beiden Nebenbedingungen

$$x_2 - x_3 = 0, \quad x_1 + 5x_2 - 2x_3 - 10 = 0$$

- Formulieren Sie die Abbildung in Abhängigkeit von einer Variablen.
- Ermitteln und klassifizieren Sie die Extremwerte von f .

9 12 PUNKTE

Gegeben sei die Absatzfunktion $Y(t)$ eines Produktes in Abhängigkeit von der Zeit $t \in \mathbb{R}_+$. Mit dem zeitabhängigen Werbeinsatz $w(t)$ läßt sich die Absatzentwicklung durch folgende Differentialgleichung beschreiben:

$$Y'(t) = -0.1Y(t) + w(t)$$

Berechnen Sie jeweils für die Anfangsbedingung $Y(0) = 100$ die Absatzfunktion $Y(t)$ und die langfristige Absatzentwicklung $\lim_{t \rightarrow \infty} Y(t)$ unter der Annahme, daß

- keine Werbung betrieben wird, d. h. $w(t) \equiv 0$.
- ein konstanter Betrag für die Werbung eingesetzt wird, d. h. $w(t) \equiv 5$.
- ein konstant wachsender Werbeinsatz getätigt wird, d. h. $w(t) = 0.1t$